

PRZECIWSKAZANIA DO ZABIEGU DEPILACJI PRIMELASE

- ciąża
- choroby nowotworowe
- świeża opalenizna (również solarium)
- samoopalacze (należy odczekać, aż preparat zostanie całkowicie usunięty ze skóry)
- kremy z retinolem (należy zaprzestać używania na miesiąc przed zabiegiem)
- przyjmowanie leków światłoczułych, retinoidów (na końcu strony wykaz leków światłoczułych)
- przyjmowanie ziół (dziurawiec, nagietek – należy zaprzestać stosowania na 2–3 tygodnie przed zabiegiem)
- przyjmowanie leków obniżających krzepliwość krwi
- bielactwo, łuszczyca
- cukrzyca
- padaczka
- depilacja woskiem, pęsetą, depilatorem (należy zaprzestać używania na miesiąc przed zabiegiem)
- peeling (należy zaprzestać na tydzień przed zabiegiem)
- aktywne infekcje skórne
- rozrusznik serca
- fotodermatozy i choroby pęcherzowe skóry
- świeże zabiegi chirurgiczne.
- nadwrażliwość na światło,
- wszczepiony stymulator lub defibrylator serca,
- bliznowiec w wywiadzie,
- otwarte rany, liczne znamiona – laser może je podrażnić,
- nietypowe lub niezdiagnozowane zaburzenia pigmentacji,
- w przypadku epilacji w obrębie twarzy przeciwwskazaniem będzie opryszczka (nowy wysiew).

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU DEPILACJI PRIMELASE

Przed pierwszym zabiegiem odbywa się konsultacja z kosmetologiem.

- Należy odstawić zioła i leki światłoczułe (2-4 tygodnie)
- zaprzestać depilacji woskiem (4-12 tygodni)
- nie używać depilatora (4-12 tygodni)
- odstawić blokery (pachy 7 dni)
- zrezygnować z solarium/ kąpiele słonecznych (minimum 4 tygodnie)
- **Na zabieg przychodzimy z obszarem ogolonym maszynką dzień wcześniej. Należy pozostawić niewielki obszar owłosienia (ok.2cm), co pozwoli kosmetologowi dostosować odpowiednie parametry epilacji do rodzaju włosa.** Ma to podstawowe znaczenie co do ilości powtórzeń zabiegów. Dobrze ustawione parametry to przede wszystkim szybszy efekt.

- W dniu zabiegu nie nakładamy na obszar poddawany epilacji żadnych kosmetyków szczególnie rozświetlaczy oraz balsamów z drobinkami
- Skóra do zabiegu powinna być pozbawiona samoopalacza oraz barwnika z opalania natryskowego.
- 2 tygodnie przed wizytą można wykonać na obszarze zabiegowym peeling lub szorstkowanie skóry.

POSTĘPOWANIE PO ZABIEGU DEPILACJI PRIMELASE

- Opalanie jest bezwzględnie przeciwwskazane 3-4 tygodni po zabiegu. W tym okresie należy stosować filtry UVA i UVB SPF 50
- Naturalnym objawem po zabiegu jest czasowe zaczerwienienie i/lub obrzęk depilowanego obszaru oraz/lub strupki. Wszystkie objawy powinny ustąpić do dwóch tygodni po zabiegu.
- W tym czasie należy skórę traktować delikatnie: myć delikatnym żelem lub tylko wodą, nie stosować preparatów alkoholowych, perfumowanych, delikatnie osuszać, nie trzeć, nie drażnić w inny sposób
- po zabiegu przez kilka dni nie należy korzystać z basenu, sauny, gorących kąpeli i gorącego prysznica, nie ćwiczyć intensywnie, aby nie wywołać efektu pocenia
- należy unikać obcisłej odzieży w miejscu wykonania zabiegu
- nie stosować dezodorantów i antyperspirantów jeśli depilacja dotyczyła pach
- pomiędzy zabiegami miejsca poddane zabiegowi należy golić maszynką, nie należy depilować tych miejsc mechanicznie (pastą, woskiem, depilatorem, pęsetą)
- jeśli wystąpi silne podrażnienie należy stosować krem Alantan lub Bepanthen
- kolejne zabiegi należy powtarzać co 4–8 tygodni (zależnie od części ciała i cech indywidualnych), aż do uzyskania odpowiedniego efektu.

WYKAZ LEKÓW ŚWIATŁOUCZULAJĄCYCH:

Antybiotyki:

Dioxycycline (Vibramycin, Vibratabs)
Demeclocycline (Declomycin) – wysoka częstotliwość występowania reakcji
Tetracycline (Achromycin I inne) Nalidixic Acid (NegGram)
Lomefloxacin (Maxaquin) – wywołujące niebezpieczne reakcje

Leki nasercowe i na nadciśnienie:

Hydrochlorothiazide (Hydrodiuril, Oretic i inne nazwy) – Wiele z nich zawiera HCTZ jako jeden ze składników.
Chlorothiazide (Diuril i inne nazwy)
Furosemide (Lasix)
Amiodarone (Cordarone) – Duży zakres fotoreakcji wywołanych lekami

Inne leki:

Chlorpromazine (Thorazine)
Methoxypsoralin
Estry PABA i/lub PABA – Używane w środkach przeciwsłonecznych, mogą wywołać pokrzywkę i wysypkę.
Ogólnie dostępne leki, które mogą czasami wywołać fotoczułe reakcje.
Alprazolam (Xanax) Amitriptyline (Elavil)
Endep
Benzocaine (Sensorcaine i wiele innych środków uśmierzających)
Captopril
Chloradiazepoxide
Chloroquine
Chlortetracycline Ciprofloxacin (Cipro)
Co-trimoxazole (Bactrim, Septra)
Dapsone
Diltiazem (Cardizem, i inne nazwy)
Diphenhydramine (Benadryl, Benylin i inne nazwy)
Enoxacin (Penetrex)
Estrogeny (Birth Control Pills, Premarini inne)
Fluoracil (5-FU) Glyburide (Diabeta, Micronase, Glynase, i inne nazwy)
Griseofulvin (GrisPeg, Fulvicin, i inne nazwy)
Haloperidol (Haldol)
Hydralazine (Apresoline) Ibuprofen (Advil, Motrin, i inne)
Isoniazid (INH) Isotretinoin (Accutane)
Methotrexate Minoxidil (Loniten, Rogaine)
Naproxen (Naprosen, Nifedipine (Procardia, Alleve, inne nazwy)
Norfloxacin (Noroxin) Nortriptyline (Aventyl, i inne nazwy)
Ofloxacin (Floxin)

Doustne środki antykoncepcyjne

Oxytetracycline
Perfenazine (Trilafon)
Phenylbutazone
Phenytoin (Dilantin)
Piroxicam (Feldene) Prochlorperazine
Promethazine
Protriptyline (Vivactil)
Quinidine (Quinidex,

Quinaglute, Cardioquin, i inne nazwy)
Quinine (Quinamm)
Sulfonamidowe antybiotyki (Bactrim, Septra, Gantrisin, i inne)
Thioridiazine (Mellaril)
Thiothixene (Navane) Tolbutamide (Tolinase)
Tretinoin (Retin-A) TriPLuoperazine
(Stellazine)
Witamina A